



Posibles factores relacionados al incremento de casos de morbilidad materna extrema, Comuna 21 – Cali, octubre 2022

Ana Lucia Angulo Ríos, Yenifer Patricia Orobio Lerma

Afiliaciones de los autores: FETP Colombia

Autor correspondiente: Ana Lucia Angulo Ríos: ana.angulo@cali.gov.co

Presentado en la 12ª Conferencia Científica Regional TEPHINET de las Américas, 26 de Septiembre 2023

Resumen

Antecedentes: En la Comuna 21 del distrito especial de Santiago de Cali, a la semana epidemiológica 40 en el 2022 se identificó un incremento de casos de morbilidad materna extrema (MME). Es importante profundizar en las causas del problema, debido a que es un evento de interés en salud pública con impacto relevante en la evaluación servicios de salud, pues la atención oportuna y de calidad en una mujer con complicación obstétrica severa puede prevenir la muerte. El objetivo del estudio fue identificar los posibles factores relacionados con el incremento de casos de MME en la Comuna 21, Cali, para contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud en el territorio y reducir la mortalidad materna evitable. **Población y métodos:** Estudio cualitativo de análisis de problemas. Se establecieron cinco sesiones con grupos de discusión de líderes comunitarios. Se identificaron debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en matriz DOFA. Posteriormente, se realizó el análisis de causas y efectos potenciales del problema de MME, mediante diagrama de Ishikawa. **Resultados:** Se encontraron cinco factores que están directa e indirectamente relacionados con el aumento de casos de morbilidad materna extrema en la Comuna 21: 1) Desconocimiento: falta información acerca de salud sexual y reproductiva, maternidad, síntomas y riesgos para gestantes; 2) desinterés: caso omiso a recomendaciones y conductas de riesgo para gestantes y bebés, conociendo implicaciones y rutas de atención; 3) redes de apoyo: apoyo institucional y familiar insuficiente para población vulnerable a problemática; 4) sistema de salud: barreras de acceso a servicios, como control prenatal, y falta oportunidad diagnóstica; 5) percepción individual: creencias, costumbres, mitos y prácticas sobre la maternidad y métodos de planificación. **Conclusiones:** El desconocimiento de signos y síntomas de alarma durante el embarazo representa una causa crítica, en relación con el aumento de casos de morbilidad de gestantes. Las causas relacionadas con la percepción individual determinan comportamientos y prácticas de riesgo para la salud de las mujeres en edad reproductiva y gestantes; para intervenirlas es necesaria la articulación entre actores interinstitucionales y comunitarios enfocada en el fortalecimiento de la vigilancia comunitaria en los territorios.

Palabras clave: maternal mortality; root cause analysis; community health practice; Colombia.

Cita sugerida: Angulo Ríos AL, Orobio Lerma YP. Posibles factores relacionados al incremento de casos de morbilidad materna extrema, Comuna 21 – Cali, octubre 2022. *Am J Field Epidemiol* 2023; 1(4), 14. doi: 10.59273/ajfe.v1i4.9745